

CJC-1295 NO DAC + IPAMORELINA

COMPLEJO SECRETAGOGO

20 mg · 3 mL

COMPOSICIÓN

CJC-1295 sin DAC	10 mg
Ipamorelina	10 mg
Contenido total	20 mg en 3 mL
Capacidad del dispositivo	80 disparos

DESCRIPCIÓN

Combinación de dos secretagogos de hormona de crecimiento que actúan mediante mecanismos diferentes y potencialmente complementarios sobre el eje GH/IGF-1.

CJC-1295 SIN DAC

Análogo de GHRH de acción corta diseñado para estimular la liberación de hormona de crecimiento a través del receptor GHRH.

IPAMORELINA

Agonista del receptor de grelina/GHSR investigado por su capacidad para estimular la secreción de hormona de crecimiento mediante una vía diferente a la del GHRH.

CONCEPTO DE LA COMBINACIÓN

CJC-1295 sin DAC → señal GHRH

Ipamorelina → señal GHSR

El fundamento fisiológico de combinarlos es estimular dos vías diferentes implicadas en la secreción de GH.

Se investigan por sus potenciales efectos sobre: secreción de hormona de crecimiento; eje GH/IGF-1; composición corporal; recuperación; calidad del sueño y bienestar. Estos efectos no deben interpretarse como beneficios clínicamente garantizados.

EQUIVALENCIA POR DISPARO

Disparos	CJC-1295 sin DAC	Ipamorelina	Total
1	125 µg	125 µg	250 µg
2	250 µg	250 µg	500 µg
3	375 µg	375 µg	750 µg
4	500 µg	500 µg	1 mg

Rendimiento: 1 disparo = 80 administraciones; 2 = 40; 4 = 20.

Las equivalencias anteriores representan exclusivamente la cantidad dispensada por la lapicera y no constituyen una recomendación posológica.

INFORMACIÓN DE USO

CJC-1295 sin DAC e ipamorelina son sustancias experimentales y esta combinación no dispone de una pauta terapéutica aprobada y estandarizada.

La dosis, frecuencia, duración y vía de administración deben ser determinadas por un profesional sanitario competente.

No debe afirmarse que la combinación reproduce necesariamente los pulsos fisiológicos naturales de GH ni que evita la alteración o desensibilización del eje, ya que estos resultados no están suficientemente establecidos mediante ensayos clínicos del producto combinado.

CONSERVACIÓN

Conservar refrigerado según las especificaciones de estabilidad de la formulación terminada. Proteger de la luz y de temperaturas extremas.

No congelar salvo que la formulación específica haya sido validada para esas condiciones.

PRECAUCIONES

No utilizar durante embarazo o lactancia. Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar ante presencia de partículas, signos de contaminación, cambios inesperados de aspecto o alteraciones del envase.

La estimulación del eje GH/IGF-1 puede tener implicancias metabólicas. Personas con alteraciones de la glucemia, enfermedades endocrinológicas, antecedentes oncológicos u otras enfermedades relevantes requieren evaluación médica individual.

ADVERTENCIA

CJC-1295 e ipamorelina no cuentan con aprobación para esta combinación terapéutica y existe información clínica insuficiente para establecer su seguridad y eficacia a largo plazo.

Este prospecto no sustituye la evaluación, prescripción ni seguimiento de un profesional sanitario.