

RETATRUTIDA 40

AGONISTA TRIPLE GIP / GLP-1 / GLUCAGÓN

RETATRUTIDA · 40 mg · 3 mL

COMPOSICIÓN

Retatrutida	40 mg
Volumen total	3 mL
Capacidad del dispositivo	80 disparos

DESCRIPCIÓN

Retatrutida es un agonista peptídico de acción prolongada que activa tres receptores metabólicos:

GLP-1 → regulación del apetito, saciedad y control glucémico.

GIP → señalización metabólica e insulínica dependiente de glucosa.

Glucagón → regulación del metabolismo energético y potencial incremento del gasto energético.

La activación simultánea de estos tres receptores está siendo investigada principalmente para el tratamiento de obesidad y trastornos metabólicos.

EFFECTOS INVESTIGADOS

Los ensayos clínicos han estudiado especialmente: reducción del peso corporal; disminución del apetito y de la ingesta energética; mejoras en determinados parámetros glucémicos; reducción de circunferencia de cintura; mejoras en algunos marcadores cardiometabólicos; reducción de grasa corporal.

Retatrutida continúa siendo un medicamento en investigación y estos datos no equivalen a una aprobación terapéutica.

EQUIVALENCIA POR DISPARO

Disparos	Retatrutida
1	0,5 mg
2	1 mg
4	2 mg
8	4 mg
12	6 mg
18	9 mg
24	12 mg

Estas equivalencias indican exclusivamente la cantidad de retatrutida dispensada por el dispositivo y no constituyen una recomendación posológica.

INFORMACIÓN DE USO

Retatrutida es un medicamento experimental y actualmente no existe una pauta de administración aprobada para productos comerciales de retatrutida.

En los ensayos clínicos se ha estudiado mediante administración subcutánea una vez por semana, utilizando diferentes dosis y estrategias de escalamiento.

La dosis inicial, escalamiento, frecuencia y duración deben ser determinados dentro de un contexto médico apropiado.

EFFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES

Los efectos adversos observados con mayor frecuencia en los estudios son principalmente gastrointestinales y pueden incluir: náuseas, diarrea, vómitos, constipación y disminución marcada del apetito.

También puede producir modificaciones de la glucemia y otros efectos metabólicos. El riesgo de hipoglucemia merece especial consideración cuando se combina con insulina o determinados medicamentos hipoglucemiantes.

No utilizar durante embarazo. Personas con enfermedades gastrointestinales, pancreáticas, biliares, endocrinológicas u otras patologías relevantes requieren evaluación médica individual.

CONSERVACIÓN

Conservar de acuerdo con los estudios de estabilidad de la formulación terminada. Proteger de la luz y de temperaturas extremas.

Si la formulación terminada requiere refrigeración, conservar entre 2-8 °C. No congelar salvo que exista validación específica de estabilidad.

ADVERTENCIA

RETATRUTIDA ES UN MEDICAMENTO EN INVESTIGACIÓN.

Su seguridad y eficacia continúan siendo evaluadas mediante ensayos clínicos. La presencia de retatrutida en este producto no implica que el producto terminado haya sido evaluado o aprobado por una autoridad regulatoria.

Este prospecto no sustituye la evaluación, prescripción ni seguimiento de un profesional sanitario.