

WOLVERINE PLUS

BPC-157 + TB-500 + VITAMINA B12

COMPLEJO PEPTÍDICO · 24 mg · 3 mL

COMPOSICIÓN

BPC-157	10 mg
TB-500	10 mg
Vitamina B12	4000 µg (4 mg)
Contenido total de activos	24 mg
Volumen	3 mL
Capacidad del dispositivo	80 disparos

DESCRIPCIÓN

WOLVERINE PLUS combina dos péptidos experimentales investigados principalmente por mecanismos relacionados con reparación y remodelación tisular, junto con vitamina B12, micronutriente esencial para el funcionamiento normal del sistema nervioso y la formación de células sanguíneas.

BPC-157

Péptido experimental estudiado principalmente en modelos preclínicos por su posible participación en procesos relacionados con reparación de tejidos, angiogénesis y respuesta inflamatoria.

TB-500

Péptido relacionado con thymosin beta-4 investigado experimentalmente por mecanismos vinculados con migración celular, angiogénesis y remodelación de tejidos.

VITAMINA B12

Vitamina esencial involucrada en la síntesis de ADN, formación normal de glóbulos rojos, metabolismo celular y funcionamiento normal del sistema nervioso.

CONCEPTO WOLVERINE PLUS

BPC-157 → investigación en reparación y respuesta tisular

TB-500 → investigación en migración celular y remodelación tisular

B12 → metabolismo celular, función neurológica y hematopoyesis

La combinación está orientada conceptualmente al soporte de procesos relacionados con recuperación y función celular. Los potenciales efectos reparadores de BPC-157 y TB-500 permanecen bajo investigación y no constituyen beneficios clínicos garantizados.

EQUIVALENCIA POR DISPARO

Disparos	BPC-157	TB-500	Vitamina B12	Total activos
1	125 µg	125 µg	50 µg	300 µg
2	250 µg	250 µg	100 µg	600 µg
4	500 µg	500 µg	200 µg	1,2 mg

Rendimiento: 1 disparo = 80 administraciones; 2 = 40; 4 = 20.

Estas equivalencias representan exclusivamente la cantidad de cada componente dispensada por el dispositivo y no constituyen una recomendación posológica.

INFORMACIÓN DE USO

BPC-157 y TB-500 son sustancias experimentales y no existe actualmente una pauta terapéutica aprobada para esta combinación.

La cantidad, frecuencia, duración y vía de administración deben ser determinadas por un profesional sanitario competente según las características individuales y el contexto clínico.

La vitamina B12 dispone de indicaciones médicas y pautas establecidas para situaciones específicas, especialmente ante una deficiencia documentada. Esas pautas no deben extrapolarse automáticamente a esta combinación.

CONSERVACIÓN

Conservar de acuerdo con las especificaciones de estabilidad de la formulación terminada. Proteger de la luz y de temperaturas extremas.

Si la formulación terminada requiere refrigeración, conservar entre 2-8 °C. No congelar salvo que exista validación específica de estabilidad.

PRECAUCIONES

No utilizar durante embarazo o lactancia sin indicación médica. Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar si se observan partículas, contaminación, cambios inesperados de aspecto o alteraciones del envase.

Ante cualquier reacción adversa, suspender la administración y consultar a un profesional sanitario.

En preparados destinados a administración parenteral deben garantizarse identidad y pureza de las materias primas, concentración, esterilidad y ausencia de endotoxinas.

ADVERTENCIA

BPC-157 y TB-500 son compuestos experimentales. La evidencia disponible sobre su seguridad, eficacia, dosis óptima, interacciones y efectos a largo plazo en humanos es limitada.

Este prospecto no sustituye la evaluación, prescripción ni seguimiento de un profesional sanitario.